

FICHA TÉCNICA



INSECTICIDA

FIPRONIL PRIME

NOMBRE COMUN	FIPRONIL 25% WG
INGREDIENTE ACTIVO	FIPRONIL
GRUPO QUIMICO	FENILPIRAZOL
FORMULACION	GRANULADO DISPERSABLE (WG)
COMPOSICION	FIPRONIL 25% p/v OTROS INGREDIENTES: 75% p/v
MODO DE ACCION	AMPLIO ESPECTRO QUE AFECTA AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DEL INSECTO
TOXICIDAD	GRUPO II - MODERADAMENTE PELIGROSO
AUTORIZACION SAG	

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

FIPRONIL PRIME es un insecticida a base de FIPRONIL de amplio espectro, de acción sistémica, de contacto e ingestión que actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

FICHA TÉCNICA



RECOMENDACIONES DE USO

CULTURA	PLAGA		DOSIS
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Algodón	Boca de Algodonero	<i>Eitinobothrus brasiliensis</i>	60-300 grs/ha
	Tripes de algodonero	<i>Frankliniella schultzel</i>	
Maiz	Oruga elasmo	<i>Elasmopalpus lignoselius</i>	300 grs/ha
	Coro	<i>Dilloboerus abderus</i>	
Soja	Cupin del montículo	<i>Procornitermes triacifer</i>	150 grs/ha
	Oruga elasmo	<i>Elasmopalpus lignoselius</i>	
	Cascudito marrón	<i>Srscsnthus mourel</i>	
	Vaquita verde	<i>Diabrotica speciosa</i>	
	Coro	<i>Phyllophaga cuvabana</i>	
	Coro	<i>Dilloboerus abderus</i>	
	Cien pies	<i>Porcellio laevis</i>	
	Grillo topo	<i>Scapteriscus spp</i>	
	Picudo de la soja	<i>Sternechus subsignatus</i>	

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES DE USO:

Para equipos terrestres: llenar con agua hasta la mitad de su capacidad, el tanque del equipo de aplicación. Accionar luego los agitadores y agregar luego la cantidad requerida del formulado. Completar con agua la capacidad del tanque. En máquinas para tratamiento de semillas: en el tratamiento húmedo, empastar la dosis indicada del curasemillas en medio litro de agua, aplicando luego esta crema sobre 100 Kg de semilla.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

debe ser aplicado de acuerdo al monitoreo de la plaga, susceptibilidad de la variedad y condiciones ambientales, dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUBSIGUIENTES:

no se observan bajo las condiciones de uso recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos fuertemente oxidantes, alcalinos o ácidos. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en la totalidad del cultivo. No aplicar en almácigo bajo vidrio

FITOTOXICIDAD:

En las condiciones de uso indicadas en producto no resulta fitotóxico.

PERIODO DE CARENCIA: ALGODÓN:

30 días MAIZ: 30 días SOJA: 30 días

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

esperar el completo secado del caldo pulverizado para reingresar al área tratada. Si necesita ingresar antes de este periodo, utilice equipos de protección recomendadas para el uso durante la aplicación.